

## موانع الإستعمال وتوخي الحذر

### أ. موانع تلقي اللقاح = يُمنع على المريض تلقي لقاح سبوتنيك

1. في حال كان يعاني من **حساسية مفرطة** تجاه أي مكوّن من مكوّنات اللقاح أو تجاه أي لقاح آخر يحتوي على مكوّنات مماثلة؛

#### المكوّنات

المادة الفعالة:

1011 x (0.5 ±1.0) جزيئات تحتوي على جين البروتين S من فيروس SARS-CoV-2

#### مواد السواغ:

بولي سوربات 80، سداسي هيدرات كلوريد المغنيسيوم، ثنائي هيدرات ملح ثنائي الصوديوم حمض الأسيتيك الإيثيلي الدياميني، إيثانول 95٪، ماء للحقن.

2. أثناء **الحمل والرضاعة**، اسأل السيدة إذا كانت تحاول الإنجاب.  
إذا كان الأمر كذلك، فعليها انتظار دورتها الشهرية لتلقي اللقاح.

3. إذا كان المريض يقل عمره عن **18 سنة**.

### موانع تلقي الجرعة الثانية من اللقاح:

**لا يمكن تلقي الجرعة الثانية من لقاح سبوتنيك V في الحالات التالية:**

مضاعفات حادة بعد تلقي الجرعة الأولى من اللقاح ومنها: صدمة الحساسية، تفاعلات تحسسية شديدة قد تصيب كل أعضاء الجسم، اضطرابات تشنجية، ارتفاع درجة حرارة الجسم لأكثر من 40 درجة مئوية، إلخ...

## ب. توخي الحذر عند استخدام اللقاح:

= على المريض أن يقدم تقرير طبي قبل تلقي لقاح سبوتنيك

يُتخذ قرار التطعيم استنادًا إلى تقييم نسبة الفوائد/المخاطر في كل حالة على حدة.

### 1. **الصرع**

2. تفاعلات تحسسية شديدة عانى منها المريض سابقًا: **التاق**

تفاعلات تحسسية شديدة (التاق)

- انتفاخ الحلق والفم
- صعوبة في التنفس
- الدوار
- الالتباس
- ازرقاق الجلد أو الشفتين
- السقوط أرضًا وفقدان الوعي.

3. أمراض الكلى = **غسيل الكلى**، نسّق مع الطبيب المعالج مواعيد غسيل الكلى قبل التطعيم وبعده.

4. بسبب نقص البيانات، قد يشكل التطعيم خطرًا على بعض المرضى بما فيهم:

- الذين يعانون من **أمراض المناعة الذاتية** (يمكن أن يؤدي تحفيز الجهاز المناعي إلى تفاقم المرض، لذا يجب توخي الحذر بشكل خاص مع المرضى)؛
- الذين يعانون من اضطراب المناعة الذاتية الذي يؤدي إلى أمراض خطيرة ومهددة للحياة.

5. المرضى الذين يعانون من الأورام الخبيثة و**السرطانات النشطة والذين يخضعون للعلاج الكيميائي أو لمعالجة طبية**. (يتم تعديل بروتوكول العلاج وفقًا لاستشارة الطبيب المعالج)

### تعليمات محددة

قد لا تكون الاستجابة المناعية كافية لدى المرضى الذين يخضعون للعلاج المثبط للمناعة والمرضى الذين يعانون من نقص المناعة. لذلك، يُمنع تناول الأدوية المستخدمة لكبت الجهاز المناعي قبل التطعيم بشهر واحد على الأقل وبعده بشهر واحد نظرًا لخطر الحدّ من القدرة المناعية.

## حالات التطعيم بدون قيود

1. الأمراض الحادة المعدية وغير المعدية - يتم التطعيم **بعد شهر واحد من الشفاء**.  
في حال التهاب الجهاز التنفسي غير الخطير أو الالتهابات المعدية المعوية الحادة، يتم أخذ اللقاح **بعد عودة درجة حرارة الجسم إلى طبيعتها**؛
2. إذا تلقى المريض أي لقاح آخر مثل لقاح ضد فيروس الورم الحليمي البشري أو لقاح المكورات الرئوية أو لقاحات الإنفلونزا الموسمية (مثل فاكسيجريب أو إنفلوفاك)، يوصى بإعطاء لقاح سبوتنيك **بعد شهر واحد من اللقاح السابق**.
3. إذا خالطت مريض كوفيد خلال الأسبوعين الماضيين، **انتظر 21 يومًا قبل أخذ لقاح سبوتنيك**.
4. **الربو**: بدون قيود
5. أمراض **الكبد** المزمنة: بدون قيود
6. اضطرابات الغدد الصماء: **الغدة الدرقية، داء السكري والكوليسترول**: بدون قيود
7. أمراض خطيرة في الجهاز **المكوّن للدم**: بدون قيود
8. أمراض الجهاز العصبي المركزي = **الزهايمر، باركنسون**، الشلل الدماغي: بدون قيود
9. متلازمة **الشريان التاجي** الحادة، الأمراض **الوعائية الدماغية** الحادة، **التهاب عضلة القلب، التهاب الشغاف، التهاب التأمور**: بدون قيود
10. **الأكزيما والصدفية**: بدون قيود
11. **حساسية الطعام**: بدون قيود
12. **مريض كوفيد** الذي أنتت نتيجة اختبار كوفيد التشخيصي له سلبية: بدون قيود
13. **سوابق عائلية أو شخصية للإصابة بالسرطان**: بدون قيود